

## VACUNAS OBLIGATORIAS QUE SE APLICAN A NIÑOS Y NIÑAS

EDAD	VACUNA
RECIÉN NACIDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Vacuna BCG:</b> protege de la tuberculosis.</li> <li>● <b>Hepatitis B:</b> previene la transmisión de la Hepatitis B</li> </ul>
2 MESES	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>1ra Pentavalente:</b> previene la difteria, tos convulsiva, tétanos, hepatitis B, Haemophilus Influenza tipo B.</li> <li>● <b>1er. Polio inyectable:</b> previene de la poliomielitis.</li> <li>● <b>1er. Rotavirus:</b> previene de diarreas graves en lactantes y niños pequeños.</li> <li>● <b>1er. Neumococo:</b> previene la otitis, sepsis, meningitis y neumonías graves.</li> </ul>
4 MESES	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>2do Pentavalente</b></li> <li>● <b>2do Polio inyectable</b></li> <li>● <b>2do Rotavirus</b></li> <li>● <b>2do Neumococo</b></li> </ul>
6 MESES	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>3ra Pentavalente</b></li> <li>● <b>3ra Polio oral</b></li> <li>● <b>1ra Influenza:</b> el Ministerio de Salud aplica esta vacuna de manera gratuita a poblaciones vulnerables, niños menores de 5 años o mayores de 60 años.</li> </ul>
7 MESES	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>2da Influenza estacional</b></li> </ul>
12 MESES	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>3era Neumococo</b></li> <li>● <b>1er SPR:</b> previene el sarampión, la rubéola y paperas.</li> <li>● <b>Varicela:</b> se recomienda la vacunación en niños y niñas a partir de los 12 meses en un esquema de una dosis, hasta los 2 años, 11 meses y 29 días.</li> <li>● <b>Influenza</b></li> </ul>
15 MESES	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Fiebre amarilla</b></li> </ul>

18 MESES	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>1er refuerzo DPT:</b> previene la difteria, tos convulsiva y tétanos.</li> <li>● <b>1er refuerzo Polio oral</b></li> <li>● <b>2do SPR</b></li> </ul>
4 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>2do refuerzo DPT</b></li> <li>● <b>2do refuerzo Polio Oral</b></li> </ul>
9 AÑOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Virus del Papiloma Humano:</b> se aplica en niñas de 5to grado de primaria en los centros educativos (previo consentimiento de sus padres) o entre 9 y 13 años en los centros de salud. La primera dosis se ha aplicado en abril y mayo, y la segunda se aplicará en octubre y noviembre.</li> </ul>

**Fuente: Minsa**